

Jedním očkováním proti černému kašli ochráníte sebe i své dítě. „dvě za cenu jedné“



Zdrojem černého (dávivého) kašle u dětí do 1 roku jsou z 67% nejbližší příbuzní, nejčastěji matka.

Každá těhotná žena (při každém těhotenství) by se měla nechat **přeočkovat proti černému kašli mezi 27. a 36. týdnem těhotenství**.
Mateřské protilátky chrání dítě do 3. měsíce po narození, do doby, než bude očkováno a vytvoří si protilátky vlastní.



Očkuje se kombinovanou vakcínou
záškrt - tetanus - černý kašel.

U dětí do 1 roku může mít onemocnění černým kašlem závažný průběh.



Nemoc se přenáší hlavně kýchním,
kašláním a smrkáním.

Původcem černého
kašle je bakterie
Bordetella pertussis.

Příznaky se objevují nejčastěji 7 - 10 dní po nákaze.

rýma, zánět spojivek, silný dráždivý až dávivý kašel,
který se postupně vyvíjí a...

- zhoršuje se v noci
- nezabírají na něj běžné léky na kašel
- může vést až ke zvracení
- může způsobit až pneumotorax

Komplikace mohou nastat u dětí i dospělých.

u malých dětí může docházet k...

- nechutenství - dítě přestává sát, ztrácí hmotnost, je dehydratované
- zánětu středouší
- zápalu plic
- hypoxii a křečím
- zástavy dechu a smrti

Očekáváte narození dítěte ve svém okolí?

**Nechte se přeočkovat proti černému kašli,
ještě než se dítě narodí.**

Minimálně jednou za život
by se měl nechat přeočkovat
každý dospělý.

